

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : B1

レジメン名称 : GEM+CDDP(胆道)

新規
 変更

提出日 : 2020 年 4 月 1 日

承認日 : 年 月 日

適応がん種 : 胆道癌

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : コース

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

消化器外科 : 病棟診療部長 元吉 誠

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1、8)
1		生理食塩液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	day(1、8) Rp1 90分 生理食塩液 500mL ↓ Rp2 15分 デキサート注6.6mg パロノセトロンバイアル0.75mg 生理食塩液50mL ↓ Rp3 30分 ゲムシタビン点滴静注 生理食塩液100mL ↓ Rp4 1時間 シスプラチン注 生理食塩液250mL ↓ Rp5 1時間 生理食塩液250mL
2		デキサート注(デキサメタゾンとして) パロノセトロンバイアル0.75mg 生理食塩液 50mL	6.6mg 1V 1本	点滴静注	末梢メイン	15分	
3	*	ゲムシタビン点滴静注 生理食塩液 100mL	1000mg/m ² 1本	点滴静注	末梢メイン	30分	
4	*	シスプラチン注 生理食塩液250mL	25mg/m ² 1本	点滴静注	末梢メイン	1時間	
5		生理食塩液 250mL	1本	点滴静注	末梢メイン	1時間	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	ゲムシタビン点滴静注	1000mg/m ²	
4	シスプラチン注	25mg/m ²	

<特記事項>

- ①ゲムシタビン点滴静注は30分間で点滴静注すること(30分以上掛けて点滴すると骨髄抑制が増強される報告あり)
- ②シスプラチン使用レジメンのため腎機能に注意、点滴中に500mL程度の飲水を指導。