

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : MA-22-1

レジメン名称 : XELOX+ビロイ(1.6㎡未満・初回用)

☐ 新規

☒ 変更

提出日 : 2024 年 7 月 1 日

承認日 : 2024 年 7 月 5 日

適応がん種 : 胃がん

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

インターバル日数 : 21日

消化器外科 : 医長 中田 博

予定コース数 : PDまで

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	
1		グラニセトロンバッグ3mg デキサート注 アロカリスバイアル235mg	1本 6.6mg 1V	点滴静注	末梢メイン	30分	Rp1 30分 グラニセトロンバッグ3mg デキサート注6.6mg アロカリスバイアル235mg ↓ Rp2 右記参照 ビロイ点滴静注 生理食塩液250mL ↓ Rp3 2時間 オキサリプラチン点滴静注 5%ブドウ糖液500mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL Rp5 day(1)夕食後～day(15)朝食後 カペシタビン錠 1日2回内服	ビロイ投与速度 0-60min 36mL/h 60-120min 72mL/h 120min- 108mL/h
2 *		ビロイ点滴静注 注射用水20mL 生理食塩液250mL	800mg/㎡ 4本 1本	点滴静注	末梢メイン	右記参照 ※100mgVは1Vあたり注射用水5mLで溶解 ※300mgVは1Vあたり注射用水15mLで溶解		
3 *		オキサリプラチン点滴静注 5%ブドウ糖500mL	130mg/㎡ 1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		
4		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分		
5 *		カペシタビン錠	2000mg/㎡	内服	経口			

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	ビロイ点滴静注	800mg/㎡	
3	オキサリプラチン点滴静注	130mg/㎡	
5	カペシタビン錠	2000mg/㎡	

<特記事項>2026年7月一部変更

- ①血管痛対策としてオキサリプラチンの溶液は5%ブドウ糖液500mLに増量
- ②血管痛対策としてオキサリプラチン投与時は温罨法の実施を推奨
- ③ビロイは溶解後12時間以内に投与を完了させる