

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-103-1
 レジメン名称 : (Ex20)CBDCA+PEM+AmivantamabSC(1コース目・80kg未満)

■ 新規
 □ 変更

提出日 : 2026 年 4 月 1 日
 承認日 : 年 月 日

適応がん種 : 非小細胞肺癌
 インターバル日数 : 21日
 予定コース数 : 4コース

医 長 名 : 呼吸器内科 島田 昌裕
 申請医師名 : 呼吸器内科 島田 昌裕
 確認薬剤師名 : 製剤主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬 剤 名	投 与 量	手 技	投 与 経 路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)、day(15)
1		デキサート注(デキサメタゾンとして) (day1) パロノセトロンバイアル0.75mg アロカリスバイアル235mg 生理食塩液50mL	9.9mg 1V 1V 1本		点滴静注 末梢メイン	15分	Rp1 15分 DEX9.9mg +パロノセトロンバイアル +アロカリスバイアル +生理食塩液50mL ↓ Rp2 10分 ペメトレキセド注 生理食塩液100mL ↓ Rp3 1時間 カルボプラチン点滴静注 生理食塩液250mL ↓ Rp4 15分 アセリオ点滴静注 ↓ Rp5 15分 ボラミン注 生理食塩液50mL ↓ Rp6 皮下注 5分 リプロファズ皮下注 1600mg ↓ Rp7 生食注10mLシリンジ ※シリンジポンプ後押し用	経口 レスタミンコーワ50mg アセトアミノフェン1000mg (治療開始60分前) ↓ Rp6 皮下注 5分 リプロファズ皮下注 2400mg ↓ Rp7 生食注10mLシリンジ ※シリンジポンプ後押し用
		レスタミンコーワ錠(day8、day15) アセトアミノフェン錠200mg	50mg 1000mg		経口			
2	*	ペメトレキセド注射用 生理食塩液100mL	500mg/m ² 1本		点滴静注 末梢メイン	10分		
3	*	カルボプラチン点滴静注 生理食塩液250mL	AUC5 1本		点滴静注 末梢メイン	1時間		
4		アセリオ点滴静注	1000mg		点滴静注 末梢メイン	15分		
5		ボラミン注5mg(day1) 生理食塩液50mL	1A 1本		点滴静注 末梢メイン	15分		
6	*	リプロファズ皮下注(day1) リプロファズ皮下注(day8、day15)	1600mg 2400mg	皮下注射 皮下注射	 	5分 5分		
7		生食注10mLシリンジ	1本		※シリンジポンプ後押し用			

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	ペメトレキセド注射用	500mg/m ²	
3	カルボプラチン点滴静注	AUC5	750mg/day
6	リプロファズ皮下注(day1)	1600mg	
	リプロファズ皮下注(day8、day15)	2400mg	

<特記事項>

- ①ペメトレキセド使用レジメンのため、治療開始7日前よりパンビタン、シアノコバラミンを使用する。その後パンビタンは連日内服、シアノコバラミンは9週毎に投与する。ペメトレキセド最終投与後、3週間は投与する。
- ②カルボプラチン点滴静注の最大投与量は750mg/dayまでとする。
- ③Ex20挿入変異陽性の患者を対象。
- ④リプロファズ皮下注は20mLシリンジで調製する。