

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-103m
 レジメン名称 : (Ex20)PEM+AmivantamabSC(維持療法・80kg未満)

■ 新規
 □ 変更

提出日 : 2026 年 4 月 1 日
 承認日 : 年 月 日

適応がん種 : 非小細胞肺癌
 インターバル日数 : 21日
 予定コース数 : PDまで

医 長 名 : 呼吸器内科 島田 昌裕
 申請医師名 : 呼吸器内科 島田 昌裕
 確認薬剤師名 : 製剤主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		デキサート注(デキサメタゾンとして) (day1) ボラミン注5mg(day1) 生理食塩液50mL	6.6mg 1A 1本	点滴静注	末梢メイン	15分	Rp1 15分 DEX6.6mg +ボラミン +生理食塩液50mL ↓ Rp2 15分 アセリオ点滴静注 ↓ Rp3 10分 ペメトレキセド注 生理食塩液100mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp5 皮下注 5分 リプロファズ皮下注 2400mg ↓ Rp6 生食注10mLシリンジ ※シリンジポンプ後押し用
2		アセリオ点滴静注	1000mg	点滴静注	末梢メイン	15分	
3	*	ペメトレキセド注射用 生理食塩液100mL	500mg/m ² 1本	点滴静注	末梢メイン	10分	
4		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
5	*	リプロファズ皮下注(day1)	2400mg	皮下注射		5分	
6		生食注10mLシリンジ	1本	※シリンジポンプ後押し用			

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	ペメトレキセド注射用	500mg/m ²	
5	リプロファズ皮下注	2400mg	

＜特記事項＞
 ①ペメトレキセド使用レジメンのため、治療開始7日前よりパンビタン、シアノコバラミンを使用する。その後パンビタンは連日内服、シアノコバラミンは9週毎に投与する。ペメトレキセド最終投与後、3週間は投与する。
 ②Ex20挿入変異陽性の患者を対象。
 ③リプロファズ皮下注は20mLシリンジで調製する。