

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-54m

レジメン 名称 : Pembro+PEM維持療法(5コース目以降)

適応がん種 : 非小細胞肺癌

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : PDまで

医 長 名 : 呼吸器内科 田村 厚久

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

確認薬剤師名 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	<p>day(1)</p> <p>Rp1 5分 生理食塩液50mL</p> <p>↓</p> <p>Rp2 30分 キイトルーダ注 生理食塩液100mL</p> <p>↓</p> <p>Rp3 5分 生理食塩液50mL</p> <p>↓</p> <p>Rp4 15分 DEX6.6mg 生理食塩液50mL</p> <p>↓</p> <p>Rp5 10分 ペムトレキセド注 生理食塩液100mL</p> <p>↓</p> <p>Rp6 5分 生理食塩液50mL</p>
2	*	キイトルーダ注	200mg	点滴静注	末梢メイン	30分	
		生理食塩液 100mL	1本	※インラインフィルター使用			
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
4		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	15分	
		生理食塩液 50mL	1本				
5	*	ペムトレキセド注射用	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢メイン	10分	
		生理食塩液100mL	1本				
6		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	キイトルーダ注	200mg	200mg
5	ペムトレキセド注射用	500mg/m <sup>2</sup>	

<特記事項>

- ①5コース目以降の維持療法用のレジメンである(シスプラチンなし)
- ②ペムトレキセド使用レジメンのため、治療開始7日前よりバンビタン、フレズミンを使用する。その後バンビタンは連日内服、フレズミンは9週毎に投与する。ペムトレキセド最終投与後、3週間は投与する。
- ③ペムトレキセドによる皮疹が懸念される場合は、投与前日～投与翌日までの3日間デキサメタゾン錠4mg × 2回/日の内服が推奨される。
- ④キイトルーダ点滴時はインラインフィルターの使用が必須