

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-55
 レジメン名称 : (short)Pembro+CDDP+PEM(1～4コース目)

☐ 新規
☒ 変更

提出日 : 2022 年 2 月 1 日
 承認日 : 年 月 日

適応がん種 : 非小細胞肺癌

医 長 名 : 呼吸器内科 田村 厚久

インターバル日数 : 21日

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

予定コース数 : 4コース

確認薬剤師名 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬 剤 名	投 与 量	手 技	投 与 経 路	点滴時間・速度	day(1)
1		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	Rp1 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp2 30分 キイトルーダ注 生理食塩液100mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 60分 アスパラK+硫酸Mg ソルデム1輸液500mL ↓ Rp5 15分 DEX9.9mg+パロノセトロンバイアル +アロカリスバイアル 生理食塩液50mL ↓ Rp6 10分 ペメトレキセド注射用 生理食塩液100mL ↓ Rp7 60分 シスプラチン注 生理食塩液250mL ↓ Rp8 30分 マンニトールS注300mL ↓ Rp9 60分 ソルデム1輸液500mL
2	*	キイトルーダ注	200mg	点滴静注	末梢メイン	30分	
		生理食塩液 100mL	1本	※インラインフィルター使用			
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
4		アスパラカリウム10mEq	1A	点滴静注	末梢メイン	60分	
		硫酸マグネシウム補正液	0.4A(8mEq)				
		ソルデム1輸液500mL	1本				
5		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢メイン	15分	
		パロノセトロンバイアル0.75mg	1V				
		アロカリスバイアル235mg	1V				
		生理食塩液 50mL	1本				
6	*	ペメトレキセド注射用	500mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	10分	
		生理食塩液100mL	1本				
7	*	シスプラチン注	75mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	60分	
		生理食塩液250mL	1本				
8		マンニトールS注 300mL	1本	点滴静注	末梢メイン	30分	
9		ソルデム1輸液500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	60分	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬 剤 名	設 定 値	上 限 値
2	キイトルーダ注	200mg	200mg
6	ペメトレキセド注射用	500mg/m ²	
7	シスプラチン注	75mg/m ²	

<特記事項> 最終更新:2022年10月 アロカリス導入

- ①1～4コース目のレジメンであり、5コース目以降は維持療法用のレジメンとなる。
- ②ペメトレキセド使用レジメンのため、治療開始7日前よりバンビタン、フレズミンを使用する。その後バンビタンは連日内服、フレズミンは9週毎に投与する。ペメトレキセド最終投与後、3週間は投与する。
- ③ペメトレキセドによる皮疹が懸念される場合は、投与前日～投与翌日までの3日間デキサメタゾン錠4mg×2回/日の内服が推奨される。
- ④キイトルーダ点滴時はインラインフィルターの使用が必須
- ⑤遅発性の吐き気が起こった場合は、day2.3にデカドロン8mg追加内服を検討する。