

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-86

レジメン名称 : Nivolumab+CBDCA+PEM

■ 新規

□ 変更

提出日 : 2023 年 7 月 1 日

承認日 : 年 月 日

適応がん種 : 非小細胞肺癌

医 長 名 : 呼吸器内科 島田 昌裕

インターバル日数 : 21日

申請医師名 : 呼吸器内科 日下 圭

予定コース数 : 3コースまで

確認薬剤師名 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬 剤 名	投 与 量	手 技	投 与 経 路	点滴時間・速度	day(1)
1		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	Rp1 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp2 30分 オプジーボ注 生理食塩液100mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 15分 DEX6.6mg+パロノセトロンバイアル +アロカリスバイアル +生理食塩液50mL ↓ Rp5 10分 ペメトレキセド注 生理食塩液100mL ↓ Rp6 1時間 カルボプラチン注 生理食塩液250mL ↓ Rp7 5分 生理食塩液50mL
2 *		オプジーボ点滴静注	360mg	点滴静注	末梢メイン	30分	
		生理食塩液 100mL	1本	※インラインフィルター使用			
				※total 100mL			
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
4		デキササート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	15分	
		パロノセトロンバイアル0.75mg	1V				
		アロカリスバイアル235mg	1V				
		生理食塩液 50mL	1本				
5 *		ペメトレキセド点滴静注	500mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	10分	
		生理食塩液 100mL	1本				
6 *		カルボプラチン点滴静注	AUC5	点滴静注	末梢メイン	1時間	
		生理食塩液 250mL	1本				
7		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬 剤 名	設 定 値	上 限 値
2	オプジーボ	360mg	360mg
5	ペメトレキセド注	500mg/m ²	
6	カルボプラチン注	AUC5	750mg

<特記事項>

- ①ペメトレキセド使用レジメンのため、治療開始7日前よりパンピタン、フレスミンを使用する。その後パンピタンは連日内服、フレスミンは9週毎に投与する。ペメトレキセド最終投与後、3週間は投与する。
- ②ペメトレキセドによる皮疹が懸念される場合は、投与前日～投与翌日までの3日間デキサメタゾン錠4mg×2回/日の内服が推奨される。
- ③オプジーボ点滴時はインラインフィルターの使用が必須
- ④カルボプラチンの最大投与量は750mgとする。