

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : P2

レジメン名称 : GEM+nab-PTX

適応がん種 : 胆道癌

インターバル日数 : 28日

予定コース数 : PDまで

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

消化器外科 : 病棟診療部長 元吉 誠

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1、8、15) |
|--------|---|--------------------|--|------|-------|---------|--|
| 1 | | デキサート注(デキサメタゾンとして) | 6.6mg | 点滴静注 | 末梢メイン | 15分 | Rp1 15分 デキサート注6.6mg アロキシバイアル0.75mg 生理食塩液50mL ↓ Rp2 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp3 30分 アブラキサン点滴静注液 生理食塩液50mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp5 30分 ゲムシタビン点滴静注液 生理食塩液100mL ↓ Rp6 5分 生理食塩液50mL |
| | | アロキシバイアル0.75mg | 1V | | | | |
| | | 生理食塩液50mL | 1本 | | | | |
| 2 | | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 5分 | |
| 3 * | | アブラキサン点滴静注液 | 125mg/m ² | 点滴静注 | 末梢メイン | 30分 | |
| | | | ※5mg/mLの懸濁液が投与量分入ったものをNS50mLの空ボトルに詰めて払い出し ※インラインフィルター使用「不可」 | | | | |
| 4 | | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 5分 | |
| 5 * | | ゲムシタビン点滴静注液 | 1000mg/m ² | 点滴静注 | 末梢メイン | 30分 | |
| | | 生理食塩液100mL | 1本 | | | | |
| 6 | | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 5分 | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|-------------|-----------------------|-----|
| 3 | アブラキサン点滴静注液 | 125mg/m ² | |
| 5 | ゲムシタビン点滴静注液 | 1000mg/m ² | |
| | | | |
| | | | |

<特記事項>

- ①ゲムシタビン点滴静注は30分間で点滴静注すること(30分以上掛けて点滴すると骨髓抑制が増強される報告あり)
- ②アブラキサンはインラインフィルター使用不可