

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : P5

レジメン名称 : GEM+S-1

適応がん種 : 膵臓、胆道癌

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : PDまで

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

消化器外科 : 病棟診療部長 元吉 誠

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1、8)
1		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液50mL	6.6mg 1本	点滴静注	末梢メイン	15分	Rp1 15分 デキサート注6.6mg 生理食塩液50mL ↓ Rp2 30分 ゲムシタピン点滴静注液 生理食塩液100mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL day(1)夕食後～day(15)朝食後 S-1配合OD錠
2 *		ゲムシタピン点滴静注液 生理食塩液100mL	1000mg/m ² 1本	点滴静注	末梢メイン	30分	
3		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
4 *		S-1配合OD錠		内服	経口		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	ゲムシタピン点滴静注液	1000mg/m ²	
4	S-1配合OD錠		100mg

<特記事項>

- ①ゲムシタピン点滴静注は30分間で点滴静注すること(30分以上掛けて点滴すると骨髄抑制が増強される報告あり)
- ②S-1(経口)はday1夕～day15朝まで内服(朝・夕食後)。その後7日間休薬。
- ③S-1投与量
BSA <1.25m² 1.25-1.5m² 1.50m² ≤
用量 60mg/day 80mg/day 100mg/day