

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : SOXC1
 レジメン名称 : SOX+C(初回)

新規
 変更

提出日 : 2021 年 2 月 1 日
 承認日 : 年 月 日

適応がん種 : 大腸
 インターバル日数 : 21日
 予定コース数 : PDまで

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人
 消化器外科 : 医長 中田 博
 確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8、15)
1		ポララミン注5mg	1A	点滴静注	末梢メイン	15分	Rp1 30分 ポララミン注5mg デキサート注6.6mg アロカリスバイアル235mg グラニセトロンバッグ3mg ↓ Rp2 2時間 アービタックス点滴静注 生理食塩液250mL ↓ Rp3 2時間 オキサリプラチン点滴静注 5%ブドウ糖液500mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp5 day(1)夕食後～day(15)朝食後 TS-1配合OD錠 1日2回内服	Rp1 15分 ポララミン注5mg 生理食塩液50mL ↓ Rp2 1時間 アービタックス点滴静注 生理食塩液250mL ↓ Rp4 5分 生理食塩液50mL
		デキサート注(day1)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	30分		
		アロカリスバイアル235mg(day1)	1V					
		グラニセトロンバッグ3mg(day1)	1本					
2 *		アービタックス点滴静注(day1)	400mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	2時間		
		生理食塩液250mL(day1)	1本					
2 *		アービタックス点滴静注(day8,15)	250mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	1時間		
		生理食塩液250mL(day8,15)	1本					
3 *		オキサリプラチン点滴静注	130mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	2時間		
		5%ブドウ糖500mL	1本					
4		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分		
5 *		TS-1配合OD錠	80mg/m ²	内服	経口			

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	アービタックス点滴静注(day1)	400mg/m ²	
	アービタックス点滴静注(day8、15)	250mg/m ²	
3	オキサリプラチン点滴静注	130mg/m ²	
5	TS-1配合OD錠	80mg/m ²	120mg

<特記事項> 最終更新:2023年9月 アロカリス導入
 ①S-1(経口)はday1夕～day15朝まで内服(朝・夕食後)、その後7日間休薬
 ②S-1投与量
 BSA <1.25m² 1.25-1.5m² 1.50m²≤
 用量 80mg/day 100mg/day 120mg/day
 ③day1とday8、15でアービタックスの投与量、投与時間が異なっている