

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : U03

レジメン名称 : GEM+CDDP(泌尿器)

適応がん種 : 膀胱癌/腎盂尿管癌

インターバル日数 : 28日

予定コース数 : 4~6コース

泌尿器科 : 医長 瀬口 健至

泌尿器科 : 医長 山中 優典

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3、4)	day(8、15)
1		ソルデム3A 500mL(day2)	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間	Rp4 15分 DEX注6.6mg 生理食塩液50mL ↓ Rp5 30分 ゲムシタピン点滴静注 生理食塩液100mL ↓ Rp8 5分 生理食塩液50mL ↓ ヘパロック  時間指定 (20:00) Rp9 12時間 生理食塩液 500mL ↓ day2のソルデム3A投与 時まで持続	↓ 時間指定 (8:00) Rp1 2時間 ソルデム3A 500mL ↓ Rp2 2時間 生理食塩液 500mL ↓ イメンドカプセル125mg ↓ Rp3 2時間 アスパラK+硫酸Mg 生理食塩液500mL ↓ Rp4 15分 アロキシ+DEX9.9mg 生理食塩液50mL ↓ Rp6 2時間 シスプラチン注 生理食塩液250mL ↓ Rp7 1時間 D-マンニトール注300mL ↓ Rp8 2時間 ソルデム3A 500mL	イメンドカプセル 80mg 朝食後 ↓ Rp4 2時間 DEX6.6mg 生理食塩液500mL ↓ Rp8 2時間 ソルデム3A 500mL	Rp4 15分 DEX注6.6mg 生理食塩液50mL ↓ Rp5 30分 ゲムシタピン点滴静注 生理食塩液100mL ↓ Rp8 5分 生理食塩液50mL
2		生理食塩液 500mL(day2)	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間				
		イメンドカプセル125mg(day2)	1C	内服	経口					
		イメンドカプセル 80mg(day3,4)	1C	内服	経口					
3		アスパラカリウム10mEq(day2)	1A	点滴静注	末梢メイン	2時間				
		硫酸マグネシウム補正液(day2)	0.4A(8mEq)							
		生理食塩液500mL(day2)	1本							
4		アロキシバイアル0.75mg(day2)	1V	点滴静注	末梢メイン	15分				
		デキサート注(デキサメタゾンとして)(day2)	9.9mg							
		生理食塩液 50mL(day2)	1本							
4		デキサート注(デキサメタゾンとして)(day3,4)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	2時間				
		生理食塩液 500mL(day3,4)	1本							
4		デキサート注(デキサメタゾンとして)(day1,8,15)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	15分				
		生理食塩液 50mL(day1,8,15)	1本							
5*		ゲムシタピン点滴静注(day1,8,15)	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢メイン	30分				
		生理食塩液 100mL(day1,8,15)	1本							
6*		シスプラチン注(day2)	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢メイン	2時間				
		生理食塩液250mL(day2)	1本							
7		D-マンニトール注20% 300mL(day2)	1本	点滴静注	末梢メイン	1時間				
8		ソルデム3A 500mL(day2,3,4)	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間				
8		生理食塩液 50mL(day1,8,15)	1本	点滴静注	末梢メイン	5分				
9		生理食塩液 500mL(day1)	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間				

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
5	ゲムシタピン点滴静注	1000mg/m <sup>2</sup>	
6	シスプラチン注	70mg/m <sup>2</sup>	

<特記事項>

①ゲムシタピン点滴静注は30分間で点滴静注すること