

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : U09
 レジメン名称 : CBZ+PSL

新規
 変更

提出日 : 2021 年 2 月 1 日
 承認日 : 年 月 日

適応がん種 : 前立腺癌

泌尿器科 : 医長 瀬口 健至

インターバル日数 : 21日

泌尿器科 : 医長 山中 優典

予定コース数 : PDになるまで

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	15分	Rp1 15分 デキサート注6.6mg ファモチジン注20mg ポラミン注5mg 生理食塩液50mL ↓ Rp2 1時間 カバジタキセル注 5%ブドウ糖液250mL ↓ Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 day(1)夕食後～day(21)朝食後 プレドニン錠 1日2回朝・夕
		ファモチジン静注20mg	1A				
		ポラミン注5mg	1A				
		生理食塩液 50mL	1本				
2	*	カバジタキセル点滴静注	25mg/m ²	点滴静注	末梢メイン	1時間	
		5%ブドウ糖液 250mL	1本		※インラインフィルター使用		
3		生理食塩液50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分	
4		プレドニン錠5mg	5mg/回	内服	経口	1日2回	

上記表にて設定する抗がん剤、薬剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	カバジタキセル点滴静注	25mg/m ²	
4	プレドニン錠	5mg/回 1日2回	

<特記事項>

- ①外科的・内科的去勢術を行い、進行または再発が確認された化学療法既治療の患者が対象
- ②カバジタキセルはインラインフィルター使用
- ③重篤な骨髄抑制が起こる可能性があるため、ジーラスタの一次予防投与を考慮すること
- ④溶解液にエタノールを含有するため、アルコール過敏に注意
- ⑤1回の投与量が65mgを超える際は、溶解液を500mLに増量する必要がある