

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : FOXC

レジメン名称 : mFOLFOX6+C

適応がん種 : 大腸

インターバル日数 : 14日

予定コース数 : PDまで

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

消化器外科 : 医長 中田 博

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)
		イメドカプセル125mg	1C	内服	経口		化学療法開始時 イメドカプセル125mg ↓ Rp1 30分 DEX6.6mg+ボラミン注5mg1A +グラニセトロンパック ↓ Rp2 2時間 アービタックス点滴静注液 生理食塩液250mL ↓ Rp3(メイン) 2時間 レボホリナート点滴静注液 5%ブドウ糖液250mL ↓ Rp3(側管) 2時間 オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液500mL ↓ Rp4(メイン) 46時間 フルオロウラシル注 生理食塩液100mL ↓ Rp4(側管) 30分 フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液 100mL	朝食後 イメドカプ セル80mg デキサメタゾ ン4mg	朝食後 イメドカプ セル80mg デキサメタゾ ン4mg	Rp2 15分 ボラミン注5mg1A 生理食塩液50ml ↓ Rp3 1時間 アービタックス点 滴静注液 生理食塩液250mL ↓ Rp6 5分 生理食塩液50mL
		イメドカプセル80mg(day2,3)	1C	内服	経口					
		デキサメタゾン4mg(day2,3)	1錠	内服	経口					
1		ボラミン注 5mg(day1)	1A	点滴静注	CVポート(メイン)	30分				
		デキサート注(デキサメタゾンとして)(day1)	6.6mg							
		グラニセトロンパック3mg(day1)	1本							
1		ボラミン注 5mg(day8)	1A	点滴静注	CVポート(メイン)	15分				
		生理食塩液 50mL(day8)	1本							
2*		アービタックス点滴静注液(day1)	400mg/m ²	点滴静注	CVポート(メイン)	2時間				
		生理食塩液 250mL(day1)	1本							
2*		アービタックス点滴静注液(day8)	250mg/m ²	点滴静注	CVポート(メイン)	1時間				
		生理食塩液 250mL(day8)	1本							
3*		レボホリナート点滴静注液	200mg/m ²	点滴静注	CVポート(メイン)	2時間				
		5%ブドウ糖液 250mL	1本		※オキサリプラチンと並列で					
3*		オキサリプラチン注射液	85mg/m ²	点滴静注	CVポート(側管)	2時間				
		5%ブドウ糖液 250mL	1本							
4*		フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注	CVポート(メイン)	46時間				
		生理食塩液 100mL	1本		※Baxter使用 ※全量105mL					
4*		フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴静注	CVポート(側管)	30分				
		5%ブドウ糖液 100mL	1本							
5		生理食塩液50mL(day8)	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	5分				

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	アービタックス点滴静注液	400mg/m ²	
2	アービタックス点滴静注液	250mg/m ²	
3	レボホリナート点滴静注液	200mg/m ²	
3	オキサリプラチン注射液	85mg/m ²	
4	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	
4	フルオロウラシル注	400mg/m ²	

<特記事項>

- ①原法と異なる、日本人用にmodifiedされたFOLFOX療法
- ②アービタックスは初回投与時のみ400mg/m²、2回目以降は250mg/m²