

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : sLV5FU  
 レジメン名称 : sLV5FU2(Baxter)

新規  
 変更

提出日 : 2022 年 1 月 25 日  
 承認日 : 2022 年 月 日

適応がん種 : 大腸

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人

インターバル日数 : 14日

消化器外科 : 医長 中田 博

予定コース数 : PDまで

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)
1		デキササート注(デキサメタゾンとして) グラニセロンバック3mg	6.6mg 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	30分	Rp1 30分 DEX注6.6mg+グラニセロンバック ↓ Rp2(メイン) 2時間 レボホリナート点滴静注液 5%ブドウ糖液250mL ↓ Rp3(メイン,Baxter使用) 46時間 フルオロウラシル注 生理食塩液100mL  Rp3(側管) 30分 フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液 100mL
2 *		レボホリナート点滴静注液 5%ブドウ糖液 250mL	200mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	2時間	
3 *		フルオロウラシル注 生理食塩液 100mL	2400mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	CVポート(メイン) ※Baxter使用	46時間 ※全量105mL	
3 *		フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液 100mL	400mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	CVポート(側管)	30分	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	レボホリナート点滴静注液	200mg/m <sup>2</sup>	
3	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	
3	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	

<特記事項>

- ①オキサリプラチン、イリノテカンを併用しないレジメンのためイメンドは使用しない。
- ②Baxter使用レジメン